ROSA VILLOSA EVRATHIANA.

R. EVRATINA. Bosc, Neuv. Cours, vol. 11, p. 256. Dest. Cat. Hort. p. 273. Lind. Mon. p. 236.

R. (EVRATINA) germinibus ovatis hispidissimis; ramis petiolisque subinermibus; foliolis quincitis ternatisve; pedunculis hispidis, fasciculato-subumbellatis, terminalibus. Pour Ency. supp. au vol. 4, 2° part. p. 714.

R. Villosa Evratina. Du P. Gymn. Ros. p. 14, spec. 5, nº 7.
Thy. Prod. groupe XI, p. 65, var. s.

LE ROSIER D'EVRATH.

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau très-vigoureux qui s'élève en buisson jusqu'à la hauteur de dix pieds. Ses tiges ne présentent, en général, qu'un très-petit nombre d'aiguillons; quelques individus, même, en sont entièrement dépourvus. Les feuilles se composent rarement de trois, le plus souvent de cinq à sept folioles très-grandes, glabres et d'un vert-foncé en-dessus, plus pâles et légèrement velues en-dessous; elles sont portées par un pétiole presque glabre et un peu glanduleux. Les fleurs, latérales et terminales, sont disposées en panicule pendant: les pédoncules qui les supportent sont, ainsi que les tubes ovoïdes-allongés des calices, recouverts d'un grand nombre de poils fermes, surmontés de glandes. Les divisions du limbe sont appendiculées, très-longues et glanduleuses. Les boutons des fleurs de ce Rosier s'épanouissent assez rarement. Gelles des



mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 220 200 200